

# Werkprotocol Agressie

Werkprotocol agressiviteit in de stal (oorbijten, staartbijten, andere bijterij)

Hoe te handelen zo spoedig mogelijk ná ontdekking?

## **Check omvang en oorzaken**

- Omvang in kaart brengen: aantal dieren, hokken, afdelingen, ernst van de wonden
- Bij (bijna) volledig aangetast hok: probeer obsessieve bijter(s) op te sporen
- Controleer werking nippel(s)
- Controleer (brij)voergift
- Controleer temperatuur, functioneert voeler?
- Controleer ventilator en luchttoevoer
- Tel aantal varkens in het hok: is er een varken bij ingesprongen?
- Indien één varken met bijtwond(en): Check of er een onderliggende aandoening is.
- Behandel oorspronkelijke aandoening
- Indien geen duidelijke oorzaak gevonden wordt: Denk na over andere stress-oorzaken
- Probleem te heftig: Bel varkensarts

## **Probeer het probleem op te lossen, behandeling van dieren**

- Isoleer obsessieve bijters
- Wonden inspraken met: \_\_\_\_\_
- Varkens worden behandeld met: \_\_\_\_\_
- Varkens met ernstige wonden worden direct apart gelegd.
- Verstrek extra strooisel: \_\_\_\_\_
- Verstrek extra afleidingsmateriaal: \_\_\_\_\_
- Probeer de stress-oorzaak op te lossen

## **Indien probleem zich vaker op vergelijkbare manier voordoet:**

- Check welzijnscheck op risicofactoren
- Loop samen met de varkensarts en voeradviseur risicofactoren langs
- Breng missende informatie in kaart en los dat op (bijvoorbeeld met Healthy Climate Monitor)
- Laat je informeren over eventuele genetische aanleg (collega's, fokkerij-adviseur)
- Maak een plan van aanpak
- Schakel samen met uw varkensarts eventueel een welzijnscoach in

UBN:.....

Naam:.....

Datum:.....

Handtekening:.....